

Séance du 25 mars 1882.

PRÉSIDENCE DE M. HAUTEFEUILLE.

M. Sauvage communique les notes suivantes :

Catalogue des poissons recueillis par M. E. Chantre pendant son voyage en Syrie, Haute-Mésopotamie, Kurdistan et Caucase,

Par M. H.-E. SAUVAGE.

1. *Mastacembelus aleppensis*, Bl.

Djerbekir (Tigre).

2. *Clarias Orontis*, Gthr.

Hammah, rivière Oronte (Syrie).

3. *Silurus Chantrei*, n. sp.

D. 3; A. 65; P. I, 13; V. 10.

Allié au *S. afghana*, Gthr., en diffère par l'épine pectorale non dentelée, la bande vomérienne subinterrompue au milieu, les barbillons plus longs.

Fleuve Koura à Tiflis.

4. *Hypselobagrus aleppensis*, C. V.

Canal de l'Oronte à Antioche ; Lac d'Antioche.

5. *Trutta bodschac*, Kess.

Lac Goktcha (Arménie russe).

6. *Cyprinus carpio*, Lin.

Tiflis.

7. *Gymnostomus gotschaicus*, Kess.

Lac Goktcha (Arménie russe).

8. *Capoeta damascina*, C. V.

Hammah sur l'Oronte ; canal de l'Oronte à Antioche ;
Lac d'Antioche ; fleuve Koura, à Tiflis.

9. *Capoeta umbla*, Hkl.

Biredjik (Euphrate).

10. *Barbus mystaceus*, Pall.

Fleuve Koura, à Tiflis.

11. *Barbus xanthopterus*, Hkl.

Biredjik (Euphrate).

12. *Barbus barbulus*, Hkl.

Hammah (Oronte) ; canal de l'Oronte à Antioche.

13. *Barbus kersin*, Hkl.

Hammah, sur l'Oronte.

14. *Barbus lacerta*, Hkl.

Fleuve Koura, à Tiflis.

15. *Barbus microphthalmus*, n. sp.

D. 11 ; A. 8 ; L. lat. 100 ; L. trans. 17/16.

Hauteur du corps contenue six fois et deux tiers, longueur de la tête cinq fois dans la longueur totale. Quatre barbillons, les supérieurs plus courts que les inférieurs ; un lobe médian épais et long à la mâchoire inférieure ; museau trois fois et demie aussi long que l'œil, dont le diamètre est contenu près de neuf fois dans la longueur

de la tête. Dorsale insérée sensiblement à égale distance de l'origine de la caudale et de l'extrémité du museau ; troisième rayon fort, les dentelures étant longues et serrées, aussi long que le museau. Ventrals insérées sous l'origine de la dorsale. Coloration uniforme. Longueur 0^m340.

Tiflis.

16. *Barbus Lorteti*, n. sp.

D. 11 ; A. 8 ; L. lat. 60 ; L. transv. 12/9.

Hauteur du corps contenue quatre fois et demie, longueur de la tête cinq fois deux tiers dans la longueur totale. Quatre barbillons de même longueur ; museau obtus, deux fois et demie aussi long que l'œil, dont le diamètre est compris six fois et demie dans la longueur de la tête. Dorsale insérée à égale distance de l'extrémité du museau et de l'origine de la caudale ; troisième rayon faible, non dentelé. Ventrals insérées sous le milieu de la dorsale. Brunâtre. Longueur 0^m450.

Antioche ; canal de l'Oronte à Antioche.

17. *Barbus grypus*, Hkl.

Biredjik (Euphrate).

18. *Labeobarbus Chantrei*, n. sp.

D. 13 ; A. 10 ; L. lat. 35 ; L. trans. 6/4.

Corps trapu, la hauteur étant contenue quatre fois et deux tiers dans la longueur totale ; longueur de la tête cinq fois et deux tiers dans la même dimension. Quatre barbillons, les supérieurs très courts, les inférieurs n'ayant guère que la moitié du diamètre de l'œil. Museau épais, obtus, une fois et deux tiers aussi long que l'œil, dont le diamètre est compris six fois dans la longueur de la tête. Dorsale insérée un peu plus près de l'extré-

mité du museau que de la base de la caudale ; troisième rayon faible. Ventrals insérées sous la première partie de la dorsale. Rembruni sur le haut du corps ; extrémité des pectorales, des ventrals et de l'anale brunâtre. Longueur 0^m430.

Lac d'Antioche ; canal de l'Oronte à Antioche ; Ham-mah sur l'Oronte.

19. *Labeobarbus Orontis*, n. sp.

D. 11 ; A. 9 ; L. lat. 50 ; L. trans. 10/10.

Poisson trapu ; dos un peu élevé au niveau de la dorsale ; chanfrein un peu déclive. Hauteur du corps contenue quatre fois et trois quarts, ainsi que la longueur de la tête, dans la longueur totale du corps. Quatre barbillons ; museau près de trois fois aussi long que l'œil, dont le diamètre est compris sept fois et demie dans la longueur de la tête. Dorsale insérée plus près de l'origine de la caudale que de l'extrémité du museau ; troisième rayon faible et non dentelé. Coloration uniforme, rembrunie sur le dos et sur la tête. Long. 0^m600.

Diffère du *B. lacerta*, Hkl. dont il a les formes, par le troisième rayon de la dorsale non dentelé, la caudale encore plus échancrée, l'absence de taches sur le corps et sur les nageoires.

Canal de l'Oronte à Antioche.

20. *Labeobarbus Euphrati*, n. sp.

D. 12 ; A. 9 ; L. lat. 70 ; L. trans. 12/8.

Corps allongé ; la hauteur étant contenue cinq fois deux tiers dans la longueur totale ; longueur de la tête quatre fois dans la même dimension. Quatre barbillons, les supérieurs plus longs et ayant près de la moitié de la longueur du museau. Museau obtus, un peu plus de trois fois plus long que l'œil, dont le diamètre est compris douze fois dans la longueur de la tête ; espace interorbitaire un peu

plus de trois fois aussi large que l'œil ; chanfrein très incliné. Dorsale insérée plus près de la base de la caudale que de l'œil ; troisième rayon épais, non dentelé. Ventrals insérées directement sous l'origine de la dorsale. Coloration uniforme. Longueur 1^m650.

Biredjik (Euphrate).

21. *Barynotus luteus*, Hkl.

Alep ; canal de l'Oronte à Antioche.

22. *Barynotus albus*, Hkl.

Orfa (Lac sacré d'Abraham ; Mésopotamie).

23. *Discognathus variabilis*, Hkl.

Hammah (Oronte) ; Lac d'Antioche ; Alep.

24. *Cyprinion macrostomus*, Hkl.

Alep.

25. *Squalius maxillaris*, C. V.

Inguil et Pergri (affluent du Lac Van).

26. *Squalius turcicus*, Fill.

Hammah (Oronte) ; Lac d'Antioche ; canal de l'Oronte à Antioche.

27. *Alburnus sellal*, Hkl.

Alep ; Hammah (Oronte) ; Tiflis.

28. *Alburnus pallidus*, Hkl.

Alep.

29. *Alburnus Orontis*, n. sp.

D. 11; A. 16; L. lat. 50; L. trans. 11/5.

Hauteur du corps contenue quatre fois et demie dans la longueur totale; tête cinq fois et un tiers dans la longueur. Museau de même longueur que l'œil, dont le diamètre est contenu trois fois et demie dans la longueur de la tête. Cinq rangées d'écaillés entre la ligne latérale et l'attache des ventrales. Dorsale se terminant au niveau de la base de l'anale, située plus près de la base de la caudale que du bord antérieur de l'œil. Une bande cérule-scente allant de l'œil à la caudale. Long. 0^m150.

Hammah (Oronte).

30. *Chondrostoma regium*, Hkl.

Hammah (Oronte); Orfa, Lac sacré d'Abraham (Mésopotamie); fleuve Koura (Tiflis).

31. *Nemachilus argyrogramma*, Hkl.

Biredjik (Euphrate).

32. *Anguilla vulgaris*, Turt.

Lac d'Antioche.

*Description de quelques poissons de la collection du Muséum
d'histoire naturelle,*

par M. H. E. SAUVAGE (1).

31. *Priacanthus Meyeri*, Gthr. (2).

D. X, 11; A. III, 10; L. lat., 45.

Hauteur du corps contenue deux fois deux tiers, lon-

(1) Cf. *Bull. Soc. Philomathique*, séances des 12 Juillet 1879, 24 Juillet 1880, 14 Mai 1881.

(2) *Proc. zool. Soc. London*, 1871, p. 656, pl. LVII.